

中 国 东 北 产 新 植 物

张 韵 冰

SOME NEW PLANTS FROM NORTH-EASTERN OF CHINA

Chang Yin-bin

1. 毛叶华北卫矛 (新变种) 图版 1—1

Euonymus maackii Rupr. var. *trichophyllus* Y. B. Chang,
var. nov.

Folia utrinque parce pubescentia, petiolis parce puberulis.
Pedicellus et fructus puberulus vel glabrous.

Heilongjiang, Yi-lan Xian, Tuchenzi, 4 Aug. 1959, Chang
Yu-liang No. 289 (Typus, in Herb. North-East. Inst. conserva-
tur).

主要特征为叶两面和叶柄有疏短柔毛。花梗和果有短柔毛或无毛。

黑龙江: 依兰县, 土城子, 1959年8月4日, 张玉良289号 (模式标
本, 存东北林学院植物标本室); 尚志县, 帽儿山, 黑龙江大学生物系,
3班5组学生, 66号; 哈尔滨市, 森林植物园, 1980年9月19日, 张韵
冰 60230, 60232号、任步钧 817号 (存东北林学院植物标本室)。

辽宁: 盖县, 熊岳标本园, 1957年8月27日, 黄普华等 69, 122号
(存东北林学院植物标本室)。

本文作者的工作单位: 黑龙江, 哈尔滨, 东北林学院 (North-Eastern Forestry Insti-
tute, Harbin, Heilongjiang)。

2. 大叶蔷薇

Rosa acicularis Lindl. Ros. Monogr. 44. t. 8. 1820.

2a. 大叶蔷薇 (原变种)

var. *acicularis*

2b. 腺叶大叶蔷薇 (新变种) 图版 2—1

var. *glandulifolia* Y. B. Chang, var. nov.

Rosa acicularis Lindl. var. *glandulosa* auct. non Liou(1955);
Yu et Ku in Sched. 1980.

Differt a var. *acicularis* stipulis subtus, petiolis et foliis
subtis glandulosis.

Heilongjiang, Huma Xian, Muhe, alt. 400m, 11, Sept. 1960,
Nie Shao-quan No. 3548 (Typus, in Herb. North-East. Forest.
Inst. conservatur).

与原变种主要区别为: 托叶背面、叶柄和叶背面有腺点。果期 9 月。

黑龙江: 呼玛县, 漠河, 海拔 400 米, 河边, 1960 年 9 月 11 日, 聂绍荃 3548 号 (模式标本, 存东北林学院植物标本室); 同地, 杂木林中, 1959 年 8 月 4 日, 张良诚等 56 号; 同地, 海拔 400 米, 沟塘上部, 樟子松林下, 1980 年 8 月, 王庆礼 112 号; 林口县, 大锅盔, 海拔 1700 米, 周以良 3369 号 (存东北林学院植物标本室)。

本变种性较耐寒, 多分布于大兴安岭北坡, 在完达山则分布于海拔 1600 米左右的高山上。

2c. 刺果大叶蔷薇 (新变种) 图版 2—2-6

var. *setacea* Liou, Ill. Fl. Lign. Pl. N.—E. China 316.
1955 (Sine lat. descr.).

Fructus primum dense setacei demum parce setacei, ramus
parce aculeatus.

Heilongjiang, Xunke Xian, 27, may 1959, Heilongjiang Forest.
2nd. Sect. No. 830 (Lectotypus, in Herb. North-East. Forest.
Inst. conservatur).

与原变种主要区别为: 果有密刺毛, 后较疏; 枝有疏刺。

黑龙江: 逊克, 二岔河, 1959 年 5 月 27 日, 黑龙江森调二大队专业组 830 号 (后选模式标本, 存东北林学院植物标本室)。

吉林：安图县，二道白河屯（长白山），杂木林内，1960年7月12日，敖志文 3854 号；抚松县，漫江，刘家堂子，海拔 1100 米，林边，1956 年 7 月 27 日，周以良等 1740 号（存东北林学院植物标本室）。

3. 无腺里白悬钩子（新变种） 图版 1—2

***Rubus matsumuranus* Lév. et Van. var. *eglandulatus* Y. B. Chang, var. nov.**

Differt a var. *matsumuranus* pedicellis, receptaculis et calycis eglandulatis.


Heilongjiang: Yichun Shi, Dailing, Liangshui, alt. 400—500m 23, July 1959, Heilongjiang Univ. Departm. Biol. No. 82 (Typus, in Herb. North-East. Forest. Inst. conservatur).

与原变种主要区别为：花梗、花托和花萼均无腺毛。


黑龙江：伊春市，带岭，凉水，海拔 400—500 米，1959 年 7 月 23 日，黑龙江大学生物系学生，82 号（模式标本，存东北林学院植物标本室）；同地，1956 年 6 月 20 日，刘金，47 号（存东北林学院植物标本室）。

吉林：抚松县，漫江，张韵冰 60242 号（存东北林学院植物标本室）。

_____ . . . _____



图版 1: 1. 毛叶华北卫矛 *Euonymus maackii* Rupr. var. *trichophyllus* Y. B. Chang 枝及叶背面(放大部分示毛); 2. 无腺里白悬钩子 *Rubus matsumuranus* Le'v. et. Van. var. *eglandulatus* Y. B. Chang 花枝及花梗(放大部分示无腺)。(许芝源绘)



图版 2: 1. 腺叶大叶蔷薇 *Rosa acicularis* Lindl. var. *glandulifolia* Y. B. Chang 果枝及叶 (放大部分示背面腺体)。2—6. 刺果大叶蔷薇 *Rosa acicularis* Lindl. var. *setacea* Liou: 2. 花枝 (示花托上具刺); 3. 萼片; 4. 花瓣; 5. 雄蕊; 6. 果实 (示果上具刺)。(许芝源绘)